

## ORGANISATION

Pour une meilleure prise en charge et organisation lors de votre venue à l'hôpital du jour, il vous est demandé de téléphoner **le jour même, à 8h30**, à la pharmacie afin de préparer le produit.

Pharmacie : **085 27 76 67**

Vous pourrez ensuite vous présenter à 10h dans le service.

**À la fin de votre cycle d'instillation un rendez-vous avec l'urologue vous sera donné pour le suivi.**

## HÔPITAL DE JOUR CHIRURGICAL ET MÉDICAL

**Chef de service  
de l'hôpital de jour chirurgical**  
Dr Jean-François MAILLART

**Chef de service  
de l'hôpital de jour médical**  
Dr Albino FLORIANI

**Infirmière en chef**  
Mme Carine HAMAITE

**Urologues**  
Dr Pierre SACRE  
Dr Balombi MATHANTU

**Secrétariat**  
☎ 085 27 73 23

---

## INFORMATIONS

**CHR DE HUY**  
*L'HÔPITAL*  
Rue des Trois Ponts 2  
4500 Huy  
085 27 21 11 info@chrh.be

### EN LIGNE

*SITE WEB*  
www.chrh.be

*RÉSEAUX SOCIAUX*



**BROCHURE À L'ATTENTION DU PATIENT**

L'instillation  
**ENDOVÉSICALE**

**chr** Huy

## QU'EST-CE QUE L'INSTILLATION ENDOVÉSICALE ?

Il s'agit d'un traitement complémentaire à votre néoplasie vésicale.

### DÉROULEMENT DE L'INSTILLATION

Il s'agit d'un sondage vésical.


- L'infirmière introduit une sonde dans votre vessie et y injecte le médicament préparé dans une seringue de 60ml par la pharmacie.
- Ensuite, la sonde est retirée.

Vous devez garder ce produit dans la vessie sans uriner pendant minimum 1h et maximum 2h.

### CONSIGNES À RESPECTER AVANT/APRÈS L'INSTILLATION

**Avant :** il est recommandé de diminuer les boissons 6h avant le traitement.

**Après :** à la première instillation, vous devez rester à l'hôpital de jour au minimum pendant 2h, sous surveillance.  
Par la suite, vous pouvez quitter le service à votre propre convenance.



Lors de la première miction, vous devrez uriner en position assise, tirer la chasse 2x et respecter les règles d'hygiène qui seront données par l'infirmière.

Pensez à bien vous hydrater durant les 48h qui suivent.

**Il est conseillé de se protéger lors d'éventuelles relations sexuelles pendant les 48h qui suivent le traitement.**

### COMPLICATIONS ÉVENTUELLES

Comme tout traitement, certaines complications peuvent survenir :

- Une brûlure à la miction ;
- Des envies fréquentes d'uriner pendant quelques jours ;
- Une modification de la couleur des urines (en fonction du médicament prescrit) ;
- De la fatigue,
- ...

Vous devrez contacter l'urologue si des symptômes importants persistent plus de 48h, tels que :

- De la fièvre supérieur à 38°C ;
- Des éruptions cutanées ;
- Un saignement dans les urines.