



CHR DE HUY

Tout ce qu'il faut savoir avant le placement d'un

CATHÉTER VEINEUX CENTRAL PERMANENT

BROCHURE À DESTINATION DES PATIENTS

RÉF. : 0570-196-0 - EDITION : 22/01/2025

chr_{Huy}

TABLE DES MATIÈRES

1. <i>Introduction</i>	4
2. <i>Choix d'un cathéter pour l'hémodialyse</i>	5
3. <i>La surveillance</i>	7
4. <i>Notes / Questions</i>	9

1.INTRODUCTION

Vous êtes un(e) futur(e) patient(e) dialysé(e), ou une personne de votre entourage le sera prochainement et la solution envisagée est la mise en place d'un cathéter veineux central permanent ?

Vous trouverez dans cette brochure les informations pratiques sur les deux types de cathéters existants et la surveillance quotidienne à réaliser.

N'hésitez pas à en parler avec votre néphrologue lors de vos consultations.

Notre équipe se tient par ailleurs à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

*Le service Néphrologie-Dialyse
du CHR de Huy*

2. CHOIX D'UN CATHÉTER POUR L'HÉMODIALYSE


Il existe deux types de cathéter pour la dialyse :

LE CATHÉTER PROVISOIRE

Il est placé dans le cas où votre arrivée en Dialyse se fait **en urgence**. Le médecin placera alors un cathéter directement dans la veine jugulaire au niveau de votre cou. Lorsque le cathéter sera en place, il le fixera avec deux fils à la peau, afin de l'empêcher de bouger.


Cette procédure dure environ 30 à 45 minutes.

AVANTAGE 	 INCONVÉNIENT
Le cathéter peut être utilisé immédiatement après le placement.	Il ne peut rester en place que quelques semaines (le risque d'infection étant très élevé).



LE CATHÉTER TUNNELISÉ

La mise en place de ce cathéter est programmée. L'intervention est réalisée en hôpital de jour, sous anesthésie locale par un chirurgien vasculaire. La durée de l'intervention est d'environ une heure.



A la différence du cathéter provisoire, le cathéter tunnelisé suit une partie du trajet sous la peau (+/- 10 cm) afin de limiter les risques d'infection. De plus, il dispose d'une gaine feutrée sur laquelle la peau cicatrisera en plus ou moins 6 semaines, cela permettra d'enlever les fils qui tiennent le cathéter et d'assurer une excellente fixation.

AVANTAGES 	 INCONVÉNIENTS
<ul style="list-style-type: none">• Ne nécessite pas de ponction• Patient plus rapidement raccordé à la machine• Utilisable presque immédiatement (il est préférable d'attendre 48h avant l'utilisation, afin de limiter les risques de saignement et d'infection)	<ul style="list-style-type: none">• Risque infectieux plus élevé (on lui préférera la fistule artérioveineuse si cela est envisageable)• Pansement en permanence

3. LA SURVEILLANCE

APRÈS L'INTERVENTION

Afin de vérifier la bonne position du cathéter, une radiographie du thorax est réalisée pour s'assurer qu'il est correctement positionné.



Durant les 48H après le placement, il est conseillé de :

- Ne pas déballer le pansement (sauf si saignement important) ;
- Ne pas dialyser via le cathéter (sauf si votre état de santé ne permet pas d'attendre) ;
- Eviter de trop porter avec votre bras et l'épaule du côté de l'implantation le temps de la cicatrisation ;
- Surveiller le pansement, un léger saignement peut apparaître, mais il ne doit pas être totalement imbibé de sang.



En cas de saignement important, présentez-vous dans le service de Dialyse (entre 7h et 18h20) ou après 18h20, aux Urgences.

Il se peut que :

- Des ecchymoses apparaissent dans la région du cou ;
- Vous ressentiez une douleur modérée et de l'inconfort, éventuellement des raideurs. Cela peut être dû au placement ou aux fils de sutures trop serrés. Essayez de trouver une position confortable et prenez des antidouleurs. Si la douleur persiste ou ne disparaît pas avec un antalgique simple, signalez-le au service Dialyse. Cela peut être le signe d'une complication ou d'un problème nécessitant une intervention médicale.

AU QUOTIDIEN

- Veillez toujours à avoir un pansement hermétique (en cas de problème, appliquer un autre pansement par-dessus).
- Ne pratiquez pas la natation, ne prenez pas de bain, mais uniquement des douches avec un pansement adhésif adapté et de préférence juste avant la dialyse. L'humidité augmente le risque d'infections.
- Le soin du cathéter est stérile, ne retirez pas le pansement vous-même.
- En cas de sortie partielle ou complète de l'extrémité du cathéter due à une traction malencontreuse, une **intervention médicale est indispensable**. Présentez-vous le plus rapidement possible dans le service Dialyse ou aux Urgences pour recevoir les soins appropriés. **En aucun cas, vous ne devez repousser le cathéter vous-même.**
- Le cathéter ne sert que pour la dialyse, dans le cas contraire, la permission préalable du néphrologue doit être demandée.
- Evitez tout objet pointu ou tranchant près de votre cathéter (ciseaux, rasoir, épingles, ...).

CONTACTEZ LE SERVICE DE DIALYSE, ET/OU PRÉSENTEZ-VOUS AUX URGENCES SI :

- Vous faites de la fièvre ou vous avez des frissons ;
- Vous avez de la douleur, une rougeur ou un gonflement au site du cathéter ;
- Vous avez un écoulement de liquide ou de pus ;
- En cas de doute ...

DIALYSE DE HUY : 085/27.75.20



*Pour votre bien-être
dans votre région*

CHR DE HUY

L'HÔPITAL

Rue des Trois Ponts 2
4500 Huy
085 27 21 11

CENTRE DE DIALYSE

Bâtiment D

SERVICE D'HOSPITALISATION

Bâtiment B, 3ème étage

EN LIGNE

SITE WEB

www.chrh.be

RÉSEAUX SOCIAUX

